



Golpes en la cabeza. ¿Cuándo hay que hacer una radiografía?



Los golpes en la cabeza en los niños, en general, tienen un riesgo pequeño de producir un daño cerebral. El riesgo depende de lo fuerte que haya sido, cómo se haya producido, la edad del niño y los síntomas que aparezcan después del golpe.

En los casos en que exista sospecha de que pueda tener una lesión cerebral, se realizan pruebas de imagen, como una radiografía o un escáner (TAC).

En un estudio reciente se analiza qué niños tienen menos riesgo de tener una lesión craneal. Encuentran que si el niño tiene más de dos meses y no tiene un hematoma en la parte lateral o posterior de la cabeza tiene un riesgo bajo de tener una lesión.

Estos resultados añaden más información a la hora de decidir a qué niños realizar pruebas radiológicas.

Más información en:

- [Evidencias en Pediatría. ¿Cuándo hay que hacer radiografía ante un golpe en la cabeza?](#)

Artículo publicado el 29-1-2016, revisado por última vez el 31-1-2016

La información ofrecida en En Familia no debe usarse como sustituta de la relación con su pediatra, quien, en función de las circunstancias individuales de cada niño o adolescente, puede indicar recomendaciones diferentes a las generales aquí señaladas.

Más referencias sobre el tema e información sobre los autores en:

<https://enfamilia.aeped.es/noticias/golpes-en-cabeza-cuando-hay-que-hacer-una-radiografia>