




https://enfamilia.aeped.es/sites/enfamilia.aeped.es/themes/enfamilia/images/enfamilia_logo_pdf.p



https://enfamilia.ae



https://enfamilia.aeped.es/sites

.aeped.es



file:///var/www/enfam

¿Sigue en aumento el sarampión en el mundo?

[El sarampión](#) es una enfermedad extraordinariamente contagiosa, con capacidad para afectar a todas las personas susceptibles pudiendo causar complicaciones potencialmente graves, pero evitable mediante vacunación

La eliminación del sarampión en el mundo es un objetivo alcanzable. La OMS y todos los países han elaborado planes para interrumpir la transmisión de la infección mediante la [vacunación](#) como primer paso para la eliminación. Para alcanzar este objetivo es necesario mantener las coberturas vacunales con dos dosis de vacuna en el umbral ≥ 95 %.

En el año 2023 se ha comprobado un notable incremento de los casos de sarampión en el mundo, que se atribuye a la reducción de las coberturas vacunales desde la irrupción de la pandemia de covid y a la finalización de las medidas de contención impuestas por las autoridades frente a la misma.

Países de nuestro entorno están experimentando una reducción de las coberturas vacunales junto con el riesgo de repunte de casos de sarampión, y por tanto proponiendo planes de respuesta. Así, en Reino Unido los datos observados les han hecho revisar y actualizar sus guías de manejo del sarampión junto con la puesta en marcha de la campaña "[Piense en el sarampión](#)", recomendando, en el caso del [Royal College of Paediatrics and Child Health](#), que, en la atención de niños con fiebre y síntomas respiratorios compatibles con sarampión, se indague activamente el estado vacunal para esta enfermedad y en caso de niños susceptibles se les someta a aislamiento hasta, al menos, 3 semanas o que se descarte el diagnóstico.

[El calendario de vacunas](#) en España incluye dos dosis de vacuna del sarampión: la primera a los 12 meses, con la vacuna triple vírica, y la segunda a los 3-4 años con la vacuna triple vírica o tetravírica, que incluye también la vacuna frente a la varicela.

En 2022, en nuestro país la cobertura de la primera dosis ha sido del 97,2 %. Sin embargo, con la segunda dosis, la cobertura es de sólo el 93,2 %, por debajo del objetivo señalado (>95 %), aunque es remarcable que los datos son mejores que los de 2021.

Por ello, es necesario no confiarse, ni bajar la guardia y seguir reforzandola vigilancia de la enfermedad y el cumplimiento de los objetivos vacunales:

- Detección y notificación de los casos sospechosos para estudio microbiológico y control epidemiológico.
- Vacunación de, al menos, el 95 % de los niños a los 12 meses (primera dosis) y a los 3-4 años (segunda dosis), junto con la búsqueda activa de niños, adolescentes y adultos susceptibles a los que se les ofrezca la vacunación.

Los profesionales implicados en la salud infantil y en las vacunaciones así como las familias tenemos por delante un campo de actuación y mejora.

¿Dónde puedo encontrar más información?

[Comité Asesor de Vacunas](#)

Artículo publicado el 12-2-2024, revisado por última vez el 12-2-2024

La información ofrecida en En Familia no debe usarse como sustituta de la relación con su pediatra, quien,

en función de las circunstancias individuales de cada niño o adolescente, puede indicar recomendaciones diferentes a las generales aquí señaladas.

Más referencias sobre el tema e información sobre los autores en:

<https://enfamilia.aeped.es/noticias/sigue-en-aumento-sarampion-en-mundo>