

Tratamiento del dolor postoperatorio en niños



Es frecuente que en los primeros días tras cualquier cirugía aparezca dolor. Aliviar este dolor es una de las prioridades en pediatría.

Para tratar el dolor de los niños una vez que vuelven a sus casas, se utilizan los analgésicos como ibuprofeno y paracetamol. También se utiliza morfina

Para conocer que es más eficaz en disminuir el dolor se ha hecho un estudio en niños que se iban a casa tras una intervención quirúrgica de traumatología. Se comparó si para tratar el dolor leve, era más eficaz el tratamiento con morfina frente al tratamiento con ibuprofeno. Se encontró que ambos tratamientos disminuían el dolor de forma similar. Sin embargo los niños con morfina tenían más efectos secundarios.

Este estudio concluye el ibuprofeno es mejor opción que la morfina para controlar el dolor ya que tiene igual eficacia, pero menos efectos adversos.

Más información:

Evidencias en pediatría.

Artículo publicado el 8-3-2019, revisado por última vez el 11-3-2019

La información ofrecida en En Familia no debe usarse como sustituta de la relación con su pediatra, quien, en función de las circunstancias individuales de cada niño o adolescente, puede indicar recomendaciones diferentes a las generales aquí señaladas.

Más referencias sobre el tema e información sobre los autores en:

https://enfamilia.aeped.es/noticias/tratamiento-dolor-postoperatorio-en-ninos