

# Vacunas antimeningocócicas

## Información para familias

### Meningococos

El meningococo es una bacteria que causa infecciones graves: meningitis, sepsis (infección generalizada), etc.:

- La **infección meningocócica invasora** (EMI) tiene una mortalidad alrededor del 10 % y causa secuelas graves en un 20-30 % de los que sobreviven
- Se tratan con **antibióticos**, pero a veces evolucionan tan rápidamente que no da tiempo a atajar la infección
- Los niños pequeños son los más afectados. Los adolescentes suelen transportar la bacteria en su garganta con más frecuencia

### Vacunas

Hay varias familias de meningococos y varios tipos de vacunas con uno o varios componentes

#### Meningococo B

#### Meningococos ACWY

#### Meningococo C

##### ¿A quién vacunar?

Todos los niños y adolescentes:

- Desde los 2 meses
- Número de dosis según la edad de comienzo

##### ¿A quién vacunar?

Todos los niños y adolescentes:

- Una dosis de meningococo C (Neisvac C) o de meningococos ACWY, según comunidades autónomas

- MenACWY (CAV-AEP)
- 4 meses
- 12 meses
- 12-18 años

**Bexsero**  
desde los 2  
meses

**Trumenba**  
desde los 10  
años

**Incluida, una u otra vacuna, en los calendarios vacunales de todas las comunidades españolas**

- **MenB** : financiada en toda España para lactantes
- **MenACWY**: con financiación pública en los calendarios de algunas comunidades y, en todas, en casos de riesgo especial

##### Otras indicaciones de las vacunas de MenACWY

- Niños a partir de las 6 semanas de edad si van a viajar/residir en zonas de mayor incidencia o países donde se vacune en calendario
- Adolescentes hasta los 18 años
- Pauta: 1 dosis desde el año de edad; 1 o 2 más un refuerzo en los menores de 12 meses

##### Reacciones adversas

- Son vacunas muy seguras
- La mayoría causan solo dolor e irritación en la zona de inyección
- Pueden causar fiebre

##### Contraindicaciones

- Alergia grave a una dosis previa de la vacuna o a algún componente

##### ¿Cómo se administran?

- Intramuscular
- En el muslo (menores de 1-2 años), y después, en el brazo (deltoides)
- Pueden administrarse a la vez que la mayoría de las demás vacunas infantiles

**Nimenrix**  
desde las 6  
semanas

**MenQuadfi**  
desde los 12  
meses

**Menveo**  
desde los  
2 años

• Disponibles en farmacias con receta médica

@CAV\_AEP • ¡Consulte con su pediatra / enfermera infantil! • v.7/2024

<https://vacunasaep.org/familias>